ialuset® HYDRO
Pansement hydrocolloïde

Stérile – À usage unique
Stérilisé aux rayons gamma

1. FORME ET PRÉSENTATIONS
ialuset® HYDRO :
- Étui de 10 pansements 10 cm x 10 cm
- Étui de 3 pansements 10 cm x 10 cm

2. COMPOSITION
ialuset® HYDRO est un pansement stérile composé de deux couches :
- une couche adhérant au pourtour de la plaie, constituée d'un polymère hydrocolloïde et de 0.2% d'acide hyaluronique, et couverte par une pellicule de protection amovible (à enlever avant application du pansement sur la plaie),
- une couche supérieure de support constituée d'un film de polyuréthane.

Lorsque l'exsudat de la plaie est adsorbé par le pansement, le gel forme une bulle visible à travers la surface extérieure du pansement.

3. PROPRIÉTÉS
ialuset® HYDRO contient des élastomères qui augmentent la capacité du pansement à contenir les exsudats de la plaie et crée un milieu humide favorable à la cicatrisation.

ialuset® HYDRO est recommandé sans distinction sur toutes les phases de la cicatrisation.

ialuset® HYDRO
pansement hydrocolloïde



Approuvé par
07 SEP. 2012
M. Caron
Directrice Qualité

Ed. IV/08.12

Laboratoires GENÉVRIER S.A. - 280 rue de Goa - Z.I. Les 3 Moulins
Parc d'activités de Sophia Antipolis - 06901 Sophia Antipolis- France

4. INDICATIONS
Cicatrisant des plaies, peu ou modérément exsudatives, aiguës (post-traumatique, dermabrasion, plaies d'étiologie diverses) ou chroniques (dont les ulcères cutanés, les escarres).
ialuset® HYDRO peut être utilisé pour la protection des plaies et des peaux fragilisées.

5. MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE
Application cutanée.
1. Avant chaque pose ou renouvellement, nettoyer la plaie au sérum physiologique et bien sécher les pourtours.
2. Enlever le film protecteur du pansement, minimiser le contact des doigts avec la surface adhésive.
3. Appliquer doucement le pansement sur la plaie, sans l'étirer, en veillant à couvrir sur 2 cm les berges de la plaie.
4. Lisser le pansement avec la main sur les pourtours de la plaie pour une bonne adhésion.
5. ialuset® HYDRO peut-être maintenu par un pansement secondaire ou une bande.

ialuset® HYDRO doit-être changé à saturation, et sans excéder 7 jours maximum.

ialuset® HYDRO doit-être changé lorsque la bulle de gel est à 1.5cm des bords de la plaie.

Pour le retrait du pansement : appuyer sur la peau avec une main, et soulever délicatement un bord du pansement avec l'autre main.

6. CONTRE-INDICATION
Ne pas utiliser en cas de sensibilité connue au pansement ou à l'un de ses constituants.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DU MÉDECIN ET À LUI SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT.

7. EFFETS INDÉSIRABLES
De rares cas d'irritation, de macération, de sensibilité de la peau, ainsi que d'hyper granulation ont été signalés.

8. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
- Le pansement favorise la détersion biologique de la plaie. Il peut alors en résulter un agrandissement de la plaie après les premiers changements du pansement.
- Le développement d'une odeur désagréable sous le pansement ne peut pas être exclu.
- La colonisation par des germes des plaies chroniques est normale et n'est pas une contre-indication à l'utilisation du pansement.

ialuset® HYDRO peut être utilisé sur des plaies infectées sous surveillance médicale ; des visites rapprochées et un traitement adapté seront alors institués.

- Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est endommagé.
- Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

9. CONSERVATION
Conserver à une température comprise entre 10°C et 25°C, ne pas réfrigérer, ni exposer à une forte humidité.
Ne pas dépasser la date d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Année d'apposition du marquage CE : 2003

Date de dernière révision de la notice :
Août 2012.

CE 0499